



Τι είναι ο τραυλισμός;

Η ταινία «Ο πόγος του βασιλιά» φέρνει στην επικαιρότητα το θέμα των διαταραχών ροής της ομιλίας

Θεραπευτική σχέση του βασιλιά Γεωργίου ΣΤ' της Αγγλίας με τον λογοθεραπευτή του, που περνά μέσα από την υπόθεση της ταινίας που προβάλλεται αυτόν τον καιρό, δίνει την αφορμή να ασχοληθούμε με ένα θέμα που αποχολεί αρκετά παιδιά και εφήβους.

Ο διευθυντής του Κέντρου Ερευνών και Θεραπείας Τραυλισμού, Γιώργος Φούρλας, μας εξηγεί:

«Οσο μακρινή είναι η εποχή στην οποία η ταινία αναφέρεται άλλο τόσο διαχρονικές και αντιφρούων πειραιές είναι οι αντιδράσεις του βασιλιά στο γεγονός του τραυλισμού: φόβος του ακροατηρίου, αποφυγή περιστάσεων, θυμός, απογοήτευση, περιορισμός ομιλίας και απάλεια έλεγχου της, κυρίως σε επικοινωνιακές περιστάσεις με πολυπλοκές ή “απειλητικό” ακροατήριο. Οι ενήλικοι και οι έφηβοι που τραυλίζουν βιώνουν καθημερινά τέτοια συνανθήματα. Ο τραυλισμός καθορίζει τις επικοινωνιακές τους επιλογές και διέπει τον ρόλο τους στην επικοινωνία. Η

δυσκολία στην ομιλία μπορεί να τους κάνει αποδέκτες κοροϊδευτικών σχολίων και να τους οδηγεί στον αποκλεισμό ή στην απορίωση. Τα παιδιά σχολικής ηλικίας που σταδιακά μεταβαίνουν από μια φάση ασυνείδητου τραυλισμού στη συνειδητοποίηση της δυσκολίας τους αρχίζουν να αναπέσσουν αμυντικούς μηχανισμούς που οδηγούν σε συμπτερηφορές αποφυγής: αποφυγή λέξεων, προσώπων, συμμετοχής σε δύσκολες περιστάσεις επικοινωνίας.

Ποιπολά έχουν αιπιλάξει από την εποχή της ταινίας σκετικά με ό,τι γνωρίζουμε για τον τραυλισμό και τους τρόπους που τον αντιμετωπίζουμε. Γνωρίζουμε πλέον ότι ο τραυλισμός είναι μια νευρογλωσσική διαταραχή που οφείλεται σε μια γενετική κληρονομούμενη προβάθεση, η οποία πυριδοτείται κάτω από ορισμένες συνθήκες. Ελλείμματα στη γλωσσική ανάπτυξη, συναισθηματική ανωριμότητα, υπερβολικές απαντήσεις, πέσεις του περιβάλλοντος τις οποίες το παιδί δυσκολεύεται να διαχειριστεί,

λανθασμένες αντιδράσεις στην εμφάνιση των πρότον συμπτωμάτων, σπρωκτικά γεγονότα, όπως ο ερχομός αδελφού ή το ξεκίνημα του σχολείου, μπορούν να πυροδοτήσουν την εμφάνιση του τραυλισμού.

Μεγάλη σημασία έχει η έγκαιρη παρέμβαση. Με την εμφάνιση των πρότον συμπτωμάτων, που συνήθως εμφανίζονται στην ηλικία των 2-2,5 χρόνων, οι γονείς θα πρέπει να απευθύνονται αμέσως σε εξεδικευμένο λογοθεραπευτή για τις πρότιν συμβουλές και οπωσδήποτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την εκδήλωση των πρότον συμπτωμάτων, ακόμα και αν μέσα σε αυτό το διάστημα υπάρχουν περίοδοι όπου το παιδί δεν τραυλίζει καθόλου. Κατά την προοχολική ηλικία, με την έγκαιρη παρέμβαση, η εδραίωση και η μονιμοποίηση του τραυλισμού μπορεί να αποφευχθούν. Από τη σχολική ηλικία και μετά η λογοθεραπεία μπορεί να λεπτουργήσει αποτέλεσματα στη μείωση της έντασης και της συκνέτευσης των συμπτωμάτων, στην ελαχιστοποίηση των συνεπειών του τραυλισμού, στην πρόληψη - αποτροπή της εξέλιξης του σε πολυπλοκότερα στάδια της δυσκολίας και σε θετική σάστι στην επικοινωνία. ♦